


Βασική Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά



Κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ

- Διασφαλίστε υψηλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ: συχνότητα, βάθος, επαναφορά θώρακα
- Σχεδιάστε τις επόμενες ενέργειες προτού διακόψετε την ΚΑΡΠΑ
- Χορηγήστε οξυγόνο
- Αγγειακή πρόσβαση (ενδοφλέβια ή ενδοοστική)
- Χορηγήστε Αδρεναλίνη κάθε 3-5 λεπτά
- Σκεφτείτε τη χρήση εξειδικευμένου αεραγωγού και καπνογραφίας
- Αδιάλειπτες θωρακικές συμπίεσεις όταν τοποθετηθεί εξειδικευμένος αεραγωγός
- Διορθώστε αναστρέψιμες αιτίες

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

- Υποξία
- Υποογκαιμία
- Υπο-/Υπερκαλιαιμία/Μεταβολικές Διαταραχές
- Υποθερμία
- Θρόμβωση (στεφανιαία ή πνευμονική)
- Υπο τάση Πνευμοθώρακας
- Καρδιακός Επιπωματισμός
- Τοξικές/θεραπευτικές διαταραχές